



Brillantaisia cicatricosa

© 2009 JMSLC

BRILLANTAISIA CICATRICOSA Lindau

Bot. Jahrb. Syst. 20: 4 (1895)

Familia: Acanthaceae

Sinónimos: *Brillantaisia ulugurica* Lindau, *Brillantaisia kirungae* Lindau, *Brillantaisia subulugurica* Burkill

Nombre común: Salvia gigante.

Descripción: Planta herbácea subarborescente muy vigorosa, con tallos erectos, generalmente puberulentos, que pueden alcanzar 2-3 m de altura. Hojas opuestas, de anchamente ovadas a cordiformes, de 6-32 x 5-24 cm, con la base cordada o de truncada a atenuada o cuneada, el margen irregularmente dentado y con dientes de tamaños diversos, rara vez entero, y el ápice de agudo a acuminado. Son glabras o subglabras, con 7-13 pares de nervios laterales; pecíolo de 0-14 cm de longitud, con la lámina gradualmente decurrente en el mismo; las hojas superiores en la base de las inflorescencias a menudo carecen de pecíolo. Inflorescencias terminales de 15-40 cm de longitud, puberulentas, con las flores hacia el final de las ramificaciones laterales. Brácteas más o menos ovadas, con la base ligeramente amplexicaule; bractéolas de elípticas a lineares, a veces persistentes en fruto. Cáliz con 5 sépalos de desigual longitud, densamente pubescentes; corola bilabiada, de color azul pálido a azul-purpúreo con marcas más oscuras en el labio superior; tubo de 6-10 mm de largo, a veces inflado; labio superior de 2-3,5 cm de largo, densamente cubierto de tricomas, a menudo glandulares; labio inferior de

2-4 cm de largo, acanalado en su superficie. Androceo con 2 estambres con los filamentos de 2-3 cm de largo y las anteras de 3-8 mm de longitud, negruzcas. Estaminodios muy delgados, de 8-2 mm de largo. Gineceo con estilo de hasta 25 mm de largo. Fruto en cápsula de 30-40 x 2-5 mm, puberulenta, conteniendo de 8 a 10 (-16) semillas negras y puberulentas de 3-4 mm en cada lóculo.

Distribución: Uganda, Kenia, Tanzania, Congo, Ruanda, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabue.

Usos: Planta interesante por sus hojas lustrosas y por sus flores, que aparecen desde mayo a septiembre. Requiere suelos drenados, ricos en compost, con riegos abundantes en el verano. Debe plantarse en climas suaves, en situaciones protegidas, a pleno sol o con algo de sombra. Después de la floración se puede aplicar una poda y rebajar la planta. Se multiplica con facilidad por esquejes. Tiene algunos usos en la medicina popular africana.

Referencias:

Sidwell, K. (1998) A revision of *Brillantaisia* (Acanthaceae). *Bull. Nat. Hist. Mus. London Bot.* 28(2): 67-113.

Lindau, G. (1895). Acanthaceae Africanae II. *Bot. Jahrb. Syst.* 20: 4.

Vollesen, K. (2008) Acanthaceae. Part. 1. Flora of Tropical East Africa. Royal Bot. Gardens, Kew.