



**Familia:** Moraceae

**Sinónimos:** *Ficus parcellii* H.J. Veitch., *Ficus canonii* (H.J. Veitch.) N.E. Br., *Ficus aspera* f. *parcellii* (H.J. Veitch.) J.E. Burrows

**Nombre común:** Higuera abigarrada.

**Lugar de origen:** Es nativo de Nuevas Hébridas (Vanuatu). Introducido en algunas islas del Caribe.

**Etimología:** El nombre del género procede del latín *Ficus-i*, nombre clásico de la higuera (*Ficus carica*) y de su fruto el higo. El epíteto específico procede del latín *asper,-a,-um* = áspero, rugoso, por el haz de las hojas. La variedad de hojas matizadas está dedicada al recolector de plantas australiano Sr. Parcell, quien descubrió dicha variedad en una expedición a las islas de los mares del sur.

**Descripción:** Arbusto o arbolito siempreverde de 3-4 (-8) m de altura en cultivo, con la corteza grisácea y con finas fisuras longitudinales, sin raíces aéreas. Estípulas triangulares, de 0,6-1,5 cm de largo, cubiertas de fino tomento, verdosas o rosadas, caedizas. Hojas alternas, dísticas, de ovadas u oblongo-ovadas a anchamente lanceoladas o elípticas, de 10-22 (-35) x 5-10 (-16) cm, con la base de redondeada a cordada y muy asimétrica, con uno de los lóbulos mayor que el otro y a veces ocultando el pecíolo, el margen entero, algo irregular o toscamente dentado, y el ápice acuminado. Tienen una textura subcoriácea, de color verde claro, aunque en 'Parcellii' están

variegadas de crema, verde grisáceo y verde oscuro de una forma irregular; son ligeramente escábridas por el haz y de velutinosas a diminutamente escábridas por el envés. Nervadura poco marcada por el haz, con 6-9 pares de nervios laterales, más prominentes por el envés. Pecíolo robusto, pubescente, de 1-2 cm de longitud. Siconos axilares, solitarios o en pares, a menudo caulinfloros a lo largo de los tallos, sobre pedúnculos pubescentes de 3-11 mm de longitud. Receptáculo más o menos globoso, de 1,8-2,5 cm de diámetro, pubescente, de color verde con líneas blancas, tornándose rosado o escarlata en la madurez, con el ostíolo apical algo elevado. Brácteas basales 3, de 1-2 mm de largo, caedizas.

**Cultivo y usos:** Especie un poco delicada pues no soporta el frío, que requiere de un clima cálido, tropical o subtropical, de suelos fértiles, bien drenados y mejor con una exposición a media sombra. Se multiplica por semillas, por esquejes y por acodos. Se utiliza mayormente el cultivar 'Parcellii', más ornamental por el colorido de sus hojas. Puede utilizarse como planta de interior en maceta, en lugares luminosos. No posee un sistema radicular agresivo como otros ficus. Si se desea que las hojas mantengan el variegado de forma intensa debe cultivarse a la sombra. Los frutos al parecer son comestibles una vez cocidos, y de la corteza se obtienen fibras.