FICUS MICROCARPA L.f.

Sp. Pl. 442 (1782) zona 9-11

Familia: Moraceae

Sinónimos: *Ficus nitida* auct. non Thunb., *Ficus retusa* auct. non L., *Ficus microcarpa* var. *crassifolia* (W.C. Shieh) J.C. Liao, *Ficus microcarpa* var. *nitida* F.C. Ho

Nombre común: Laurel de Indias, laurel de Cuba.

Lugar de origen: Es nativo de China, Bután, India, Malasia, Myanmar, Nepal, Nueva Guinea, Sikkim, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, llegando hasta el norte de Australia.

Etimología: El nombre del género procede del latín *Ficus-i,* nombre clásico de la higuera (*Ficus carica*) y de su fruto el higo. El epíteto específico *microcarpa* procede del griego *mikrós* = pequeño y *karpós* = fruto, semilla, en alusión a sus pequeños frutos. Su nombre popular hace referencia al supuesto parecido de su hoja con la de un "laurel" y a su procedencia de las Indias Orientales, que es el nombre dado antiguamente a todo el sudeste y sur de Asia, o a su popularidad en la isla caribeña de Cuba.

Descripción: Árbol siempreverde, corpulento, de hasta 15-20 m de altura, con una copa globosa, amplia y muy frondosa, y un tronco grueso de corteza lisa y grisácea, a menudo con numerosas raíces superficiales abarcando una zona amplia; ramillas glabras o pubérulas, de color castaño. Estípulas lanceoladas, de 0,8-1,5 cm de largo, normalmente glabras, pronto caedizas. Hojas dispuestas en espiral o subdísticas, con la lámina de ovado-elíptica a casi lanceolada o rómbica, de 3-12 x 1,5-6 cm, con la base de ancha a estrechamente cuneada, el margen entero y el ápice de obtuso a subagudo, a veces brusca y cortamente acuminado. Su textura es algo coriácea y la superficie es glabra, de color verde fuerte brillante, algo más pálidas por el envés; la nerviación es muy fina y poco resaltada, con 5-9 (-12) pares de nervios laterales paralelos y formando un ángulo agudo, más 1 par basal que puede llegar casi hasta la mitad de la lámina. Pecíolo de 0,5-1 cm de longitud, ligeramente acanalado. Siconos axilares, sésiles, dispuestos en pares, con flores masculinas y femeninas diferenciadas en su interior; receptáculos más o menos deprimido-globosos, de 0,9-1,2 cm de diámetro, glabros, de verdosos a amarillentos o rosados, tornándose jugosos y de color púrpura oscuro en la madurez si han sido fertilizados, con ostíolo u orificio apical poco resaltado y cubierto por 2-3 brácteas deltoides. Brácteas basales 3, glabras, anchamente ovadas, de 1,5-3,5 mm de largo, persistentes. Es una especie bastante variable por lo extenso del ámbito geográfico donde se distribuye, reconociendo muchos autores la var. **hillii** (F.M.Bailey) Corner, la var. **rigo** (F.M. Bailey) Corner y la var. **saffordii** (Merr.) Corner, mientras que otros autores consideran también la var. **crassifolia** (W.C. Shieh) J.C. Liao, la var. **fuyuensis** J.C. Liao y algunas otras.

Cultivo y usos: Especie muy resistente que requiere climas templados, y aunque soporta bien el frío moderado, no tolera las heladas. Crece en casi toda clase de suelos, siempre que drenen bien, en exposiciones soleadas o con media sombra. Soporta bien la polución de las ciudades y relativamente la cercanía a las zonas costeras, pero no muy cerca del mar. Admite bien toda clase de podas y recortes, incluso técnicas de topiaria. Se multiplica por esquejes y por acodos aéreos. Es un árbol con una copa muy densa, por lo que proyecta una excelente sombra, utilizándose de forma aislada o formando alineaciones, debiendo tener presente su gran desarrollo para no situarlo muy próximo a las viviendas y obra civil, y con una separación entre árboles al menos de 10-12 metros. En nuestro país puede padecer el ataque de algunas plagas, como el trips (*Gynaikothrips ficorum*), la psila del ficus (*Macrohomotoma gladiata*) o la mosca blanca (*Aleurodicus floccissimus*).

© 2016 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es