



Familia: Scrophulariaceae

Sinónimos: *Capraria lanceolata* L.f., *Capraria salicifolia* Salisb., *Freylinia cestroides* Colla, *Buddleja glaberrima* Loisel.

Nombre común: Freilinia.

Lugar de origen: Sudáfrica.

Etimología: El género honra al italiano Pietro Lorenzo (1754-1820), último conde de Freilino, botánico y propietario de un afamado jardín en Buttigliera, del que realizó un catálogo de su flora. El epíteto específico procede del latín *lanceolatus*, -a, -um = lanceolado, armado con una pequeña lanza, en referencia a sus hojas.

Descripción: Arbusto o arbolito siempreverde de 3-5 m de altura, generalmente con varios troncos cuando se forma con porte arborescente, con la corteza grisácea y más bien lisa, muy ramificado, con los tallos largos y arqueados y el follaje dándole aspecto de sauce; ramillas tetrágonas, opuestas, divaricadas o erectas, verdosas, glabras o a veces algo pubescentes, hojosas. Hojas opuestas, de estrechamente elípticas a lineares o linear-lanceoladas, de 4-12 x 0,4-1,3 cm, con la base atenuada, el margen entero y el ápice agudo; son de textura herbácea, a veces subfalcadas, de color verde mate, glabras, con el nervio medio destacado por el envés y la nerviación secundaria poco perceptible; pecíolo muy corto y más o menos decurrente en el tallo donde se inserta. Inflorescencias en panículas terminales densas, de 9-20 cm de longitud, bracteadas, con flores de 1-1,5

cm de largo, aromáticas y melíferas, sobre pedicelos cortos y gruesos; cáliz con 5 sépalos ovados, de 3-4 mm de largo, obtusos, apiculados, verdosos, ciliolados; corola infundibuliforme, con el tubo subcilíndrico, de 6-8 mm de largo, blanquecino en la parte inferior y amarillento en la superior, ligeramente peloso internamente y glabro externamente, con el limbo de 5-6 mm de diámetro, con 5 pétalos triangulares, extendidos o revolutos, obtusos, amarillentos, imbricados en el brote. Androceo con 4 estambres didínamos, a veces con un quinto estambre estéril, todos inclusos, con las anteras asomando ligeramente. Estilo tan largo como el tubo de la corola. Fruto en cápsula marrón, de 6-8 mm de diámetro.

Cultivo y usos: Planta que se propaga fácilmente bien por semillas, que germinan con rapidez, o por esquejes de madera semidura en verano, teniendo las plantas un crecimiento bastante rápido. Es algo resistente al frío siempre que no sea muy intenso, y gusta de una exposición soleada, de suelos con buen drenaje y de riegos en verano, creciendo más rápidamente con suficiente aporte de humedad. Podemos cultivarlo como gran arbusto, con varios tallos desde el suelo, o como un arbolito mediante la poda y selección de uno de los tallos principales, labor que debe realizarse poco a poco y que puede durar varios años. Aunque el grueso de su floración en la zona mediterránea ocurre en otoño-invierno, puede florecer esporádicamente a través del año.