# RHODODENDRON x SMITHII Sweet

Brit. Fl. Gard. 4, t. 50 (1831) zona 7-9

**Familia**: Ericaceae

**Sinónimos**: Rhododendron grupo Smithii, Rhododendron 'Cornish Red'

**Nombre común**: Rododendron híbrido.

**Lugar de origen**: Híbrido de jardín obtenido en Coombe Wood, Inglaterra, en 1826, fertilizando *Rhododendron ponticum* con polen de *Rhododendron arboreum* subsp. *arboreum*

**Etimología**: el género procede del griego *rhodon* = rosa y *dendron* = árbol, por su aspecto. El epíteto específico honra la memoria de su obtentor, el horticultor inglés William Smith.

**Descripción**: Arbusto siempreverde de crecimiento vigoroso y porte arborescente, con un desarrollo notable, pudiendo alcanzar una altura de 8-9 metros en España, con una copa amplia, densa y globosa, y uno o varios troncos más bien cortos, con la corteza lisa de color marrón rojizo, que se desprende en placas. Ramillas jóvenes frecuentemente pubescentes o ligeramente híspidas. Hojas alternas, agrupadas densamente hacia el ápice de los tallos, de obovadas a elíptico-lanceoladas, de 8-15 x 2,5-5 cm, con la base atenuada, el margen entero y el ápice agudo o acuminado. Son de textura coriácea, de color verde liso y mate por el haz, y más pálidas por el envés, presentando especialmente cuando jóvenes un indumento característico blanquecino que amarillea con el paso del tiempo. Pecíolo corto y robusto, pubescente de joven. Inflorescencias en corimbos o racimos terminales compactos de hasta 20 flores, sustentadas por brácteas membranáceas; son bisexuales, ligeramente zigomorfas, con un cáliz de 2 mm de longitud, con 5 dientes algo variables, heredados de sus parentales. La corola es infundibuliforme-acampanada, de 4,5-5 x 5-5,5 cm, con 5 lóbulos de color variable según la selección, aunque la coloración original exhibe tonalidades desde el rojo escarlata hasta el rosa intenso, a veces con manchas punteadas más oscuras en el interior del lóbulo superior, un rasgo derivado de la influencia de R. arboreum. Androceo con 10 estambres, con los filamentos curvados hacia el ápice. Gineceo con un ovario súpero con 10 lóculos; estilo glabro o ligeramente glandular en la base. Fruto en cápsula septicida de textura leñosa y forma cilíndrica que, al madurar, se abre longitudinalmente, liberando numerosas semillas diminutas, aladas y de dispersión anemócora.

**Cultivo y usos**: Requiere cultivarse en climas templados, sin heladas tardías, pues podrían comprometer la floración, en zonas resguardadas de los vientos, con una exposición de sol filtrado o de sombra parcial. Demanda suelos sueltos y fértiles, bien drenados, de pH ácido, no tolerando en absoluto los suelos alcalinos, que le provocan clorosis férrica. Necesita riegos frecuentes que mantengan un mínimo de humedad, utilizando agua de buena calidad, libre de sales.

© 2026 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es