



Brachychiton x roseus Guymer

Ovario pubescente, con estilos connados, glabros, de 1,6-2,3 mm de longitud y estigmas ovoides, unidos hasta la mitad. Folículos glabros, elipsoides, estipitados, rostrados, erectos, de 7-11 x 2,5-3 cm, con el ápice ligeramente incurvado, conteniendo 3-13 semillas ovoides, lisas, de 7,5-8,5 x 5-5,5 mm.

Cultivo y usos: Árbol adaptable a muchos tipos de suelos que gusta de exposición soleada o ligera sombra y suelos bien drenados, tolerando la sequía y el frío si no es demasiado intenso. Se multiplica por semillas con facilidad, recogiendo los frutos del árbol una vez maduros, que es cuando son de color negro y están abiertos, pudiéndose desprender las semillas con facilidad. La germinación es alta y no necesita tratamientos previos. Árbol de rápido crecimiento. Se cultiva aislado, en grupos o en alineaciones. Es un árbol vigoroso que en lugares pavimentados puede ocasionar problemas.

BRACHYCHITON x ROSEUS Guymer

Austral. Syst. Bot. 1: 308 (1989)

Familia: Sterculiaceae (ahora Malvaceae, subfamilia Sterculioideae)

Nombre común: Braquiquito rosado.

Lugar de origen: híbrido hortícola entre *B. acerifolius* F. Muell. y *B. populneus* (Schott & Endl.) R.Br.

Etimología: *Brachychiton* deriva del griego *brachys* = corto y *chiton* = túnica o cubierta, en alusión al corto tomento que recubre a las semillas o, lo que es más probable, a la cubierta externa persistente de las semillas. El epíteto específico procede del latín *roseus, -a, -um* = rosado, por el color de sus flores.

Descripción: árbol siempreverde de 10-12 m de altura en cultivo, de tronco cilíndrico con la corteza grisácea, finamente fisurada, y ramillas glabras. Hojas normalmente enteras, en ocasiones trilobadas, de ovado-lanceoladas a ovadas, de 8-15 x 4-7 cm, con la base cuneada o truncada y el ápice obtuso u ocasionalmente agudo; son glabras, de color verde oscuro brillante por el haz y algo más pálidas por el envés. Pecíolo de 4-10 cm de largo. Inflorescencias en panículas axilares de 10-25 cm de largo, con los ejes rosados, glabros, portando de 30 a 100 flores con los pedicelos articulados, puberulentos por encima de la articulación. Brácteas caedizas, de ovadas a lanceoladas, obtusas o agudas, puberulentas externamente, de 1-3 mm de largo. Flores rosadas, de 1,5-2 cm de largo, con perianto acampanado de (4-) 5 (-6) lóbulos triangulares, recurvados, con los márgenes induplicados, glabro o con algunos pelos espaciados externamente y puberulento en su interior. Androginóforo de las flores masculinas blanco, glabro, de 4-7 mm de largo, el de las flores femeninas blanco, cilíndrico, de 1-2 mm de largo. Estambres 15-20, glabros, con las anteras amarillas.