PRUNUS CERASIFERA Ehrh.

Gartenkalender 4: 190 (1785) zona 7-9

Familia: Rosaceae.

Sinónimos: *Prunus domestica* var. *cerasifera* (Ehrh.) Poir., *Prunus divaricata* Ledeb., *Prunus myrobalana* (L.) Desf.

Nombre común: Ciruelo mirobalano.

Lugar de origen: Yugoslavia, Rumanía, Albania, Bulgaria, Grecia, Irán, Iraq, Turquía, Líbano, Ucrania, Cáucaso, Afganistán, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán. Introducido en numerosos países.

Etimología: El género procede del latín p*runus,-i* = el nombre clásico del ciruelo y el endrino. El epíteto específico procede del latín *cerasus,-i* = el cerezo, con el sufijo *-fer,-fera,-ferum*, que significa llevar o producir, por sus frutos parecidos a las cerezas.

Descripción: Arbolito caducifolio de 3-5(-7) m de altura, inerme o a veces con algunas espinas de joven, con una copa redondeada u ovoide, abierta y extendida con el paso de los años, y un tronco de corteza más o menos lisa y escamosa, de color marrón grisáceo o marrón rojizo. Ramillas verdosas, glabras. Yemas ovoides, con escamas coriáceas de color marrón, de 2-6 mm de largo. Estípulas subuladas, de 4-8 mm de largo, caedizas. Hojas simples, elípticas, ovadas u obovadas, de 3,5-7 x 2-4 cm, con la base cuneada o redondeada, el margen fina e irregularmente glandular-dentado y el ápice agudo. Son de textura delgada, glabras y de color verde oscuro por el haz, y más pálidas y con ligera pubescencia en el nervio medio por el envés. En algunos cultivares las hojas son más o menos purpúreas. Nervadura hundida por el haz y resaltada por el envés, con 6-8 pares de nervios secundarios laterales que ramifican antes de llegar al margen. Pecíolo de 6-15 mm de largo, glabro o ligeramente pubescente de joven. Flores abundantes, solitarias o en pares, de 2-2,5 cm de diámetro, apareciendo normalmente antes que las hojas, sobre pedicelos glabros o ligeramente pubescentes de 10-20 mm de longitud. Receptáculo cupuliforme, glabro, de 2-2,5 mm de largo. Cáliz con 5 sépalos oblongos, redondeados, de 2-4 x 1,5-3 mm, diminutamente glandular-ciliados hacia el ápice; corola con 5 pétalos obovados, con la base cuneada y el ápice obtuso, de 6-7 x 4-5 mm, blancos o ligeramente rosados. Androceo con 25-30 estambres con filamentos delgados de 5-6 mm de largo y anteras redondeadas. Gineceo con un ovario glabro, estilo de 5-6 mm de largo y estigma capitado. Frutos drupáceos, globosos, lisos y ligeramente pruinosos, de 2,5-3 cm de diámetro, amarillentos, rojos o purpúreos, con una pulpa amarillenta algo ácida. Pireno anchamente ovoide, algo comprimido, de 1,2-1,5 cm de largo, liso o estriado y con 2 surcos submarginales.

Cultivo y usos: Especie rústica y muy adaptable, resistente al frío, que prefiere suelos bien drenados, de pH neutro, con aporte de riegos en el verano y bajo una exposición soleada, especialmente los cultivares de hojas purpúreas. Se multiplica por semillas y los cultivares por esquejes o injertos. Especie frecuente en parques y jardines, especialmente los cultivares **'Atropurpurea'** ('Pissardii'), con hojas rojizo-purpúreas, flores blanco-rosadas y frutos purpúreos y **'Nigra'**, muy similar, pero con las hojas de color púrpura muy oscuro.

© 2025 José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres
www.arbolesornamentales.es